



Kinderwunsch bei Querschnittlähmung | Männer

Bei ca. 95% der querschnittgelähmten Männer ist auf Masturbation kein Samenerguss möglich. Entsprechend des Lähmungsbildes kommen deshalb spezielle Geräte zur Samengewinnung zum Einsatz.

Konservative Therapiemöglichkeiten

- » Penile Vibrostimulation
- » Rektale Elektrostimulation

Operative Therapiemöglichkeiten

- » Probeentnahme aus Nebenhoden/Hoden (MESA/TESE)

Ist eine Gewebeprobeentnahme aus dem Hoden zur Samenisolierung notwendig bzw. ist die Anzahl der gewonnenen Samenzellen durch die o. g. Techniken zu gering, dann ist die Fertilisierung nur mit Hilfe der mikroassistierten Insemination (ICSI) möglich. Dies wird nur an spezialisierten Zentren durchgeführt.

Wir arbeiten mit der Gemeinschaftspraxis für gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin (Frau PD Dr. Fritzsche) in Jena zusammen. Es besteht auch die Möglichkeit, die Samenzellen entsprechend aufzubereiten und einzufrieren und in einem heimatnahen Zentrum die Übertragung vornehmen zu lassen.